

# 应用数学与信息技术专业入学考试大纲

专业名称：应用数学与信息技术

Прикладная математика и технологии

Applied mathematics and Technology

考试课程名称：数学与编程

Математика и программирование

Mathematics and programming

## 考试内容

考试涵盖以下科目的试题：数学分析、线性代数、离散数学、常微分方程、偏微分方程、概率论、数值方法以及编程优化理论。

На экзамене предлагаются задания по дисциплинам: Математический анализ, линейная алгебра, дискретная математика, обыкновенные дифференциальные уравнения, уравнения в частных производных, теория вероятностей, численные методы, теория оптимизации программирование.

The tasks are taken from the following topics: mathematical analysis, linear algebra, discrete mathematics, ordinary differential equations, partial differential equations, probability theory, numerical methods and programming optimization theory.

## 考试形式及要求

线下形式（笔试）

Очная форма (письменный экзамен)

Offline form (written exam)

## 院系咨询人及电话

咨询人：姚老师

咨询电话：0755-28323285

## ПРИМЕРЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЗАДАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ

1. Найдите область сходимости функционального ряда  
找出函数项级数的收敛区域。

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3n-1} \left( \frac{1-x}{1+2x} \right)^n.$$

2. Дана Си-функция `equation()`. Если она содержит ошибку, обоснуйте это в качестве ответа. Если возможно привести код функций `f()` и `g()`, при которых функция `equation()` всегда возвращает значение `TRUE`, напишите код этих функций. Иначе обоснуйте, что хотя бы для одной из функций `f()` и `g()` это сделать нельзя.

给定C语言函数 `equation()`。如果函数 `equation()` 有错误，请说明理由。如果存在使得 `equation()` 函数返回值总为 `TRUE` 的函数 `f()` 和 `g()`，请写出代码。如若不能，请说明在 `f()` 和 `g()` 中至少有一个不能使 `equation()` 函数的返回值为 `TRUE`。

```
#include <stdio.h>
int f(void);
int g(const int *, int);
int equation(void)
{
    int a[1024] = {0};
    int i;
    if (scanf("%d", &i) == 1 && 10 <= i && i < 100)
    {
        a[i] = 2023;
        return a[g(&a[10], 90)] == 2023;
    }
    return f() == 1 - f();
}
```

3. Базисом линейного пространства  $L_1$  являются векторы  $\bar{g}_1(2, 3, 2)$  и  $\bar{g}_2(1, 1, 3)$ , а базисом линейного пространства  $L_2$  – векторы  $\bar{f}_1(1, 1, 1)$  и  $\bar{f}_2(2, 1, 4)$ . Найдите расстояние от точки  $M(3, 4, -1)$  до пересечения пространств  $L_1$  и  $L_2$ .

线性空间  $L_1$  的基向量为  $\bar{g}_1 = (2, 3, 2)$  和  $\bar{g}_2 = (1, 1, 3)$ , 线性空间  $L_2$  的基向量为  $\bar{f}_1 = (1, 1, 1)$  和  $\bar{f}_2 = (2, 1, 4)$ . 请找出点  $M(3, 4, -1)$  到空间  $L_1$  和  $L_2$  交点的距离.

4. Найдите все решения дифференциального уравнения  
请找出满足初始条件  $y(2) = 3$  微分方程的所有解

$$y - y' = y^2 + xy',$$

удовлетворяющие начальному условию  $y(2) = 3$ .

5. Пусть в простом неориентированном графе 65 вершин и 2021 ребро. Сколько в нем может быть компонент связности? Обоснуйте ваш ответ!

假设一个简单无向图有 65 个顶点和 2021 条边, 联通分量数可能是多少? 请写出答案并解释!

6. Плотность вероятности случайной величины  $X$  имеет вид  
随机变量  $X$  的概率密度函数如下:

$$f(x) = \begin{cases} A, & \text{если } |x + 2| \leq 3, \\ 0, & \text{если } |x + 2| > 3. \end{cases}$$

Найдите значение константы  $A$ , математическое ожидание  $M[X]$  и дисперсию  $D[X]$  случайной величины  $X$ .

求常数值  $A$ , 随机变量  $X$  的数学期望  $M[X]$  和 方差  $D[X]$

7. Числа  $A, B, C$  таковы, что величина  $\int_{-1}^1 (x^3 - (Ax^2 + Bx + C))^2 dx$  принимает минимальное возможное значение. Найдите это значение.

$$\int_{-1}^1 (x^3 - (Ax^2 + Bx + C))^2 dx$$

принимает **минимальное** возможное значение. Найдите это значение.

8. Найдите решение задачи (функцию  $u(x, t)$ ) 请找出关于函数  $u(x, t)$  的解

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = a^2 u_{xx}(x, t) + x^2 t, & -\infty < x < +\infty, 0 \leq t < +\infty; \\ u(x, 0) = \sqrt{x}, u_t(x, 0) = \sin x, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

© ВМК МГУ-ППИ, 2024.

**Ответы:**

1.  $x \in (-\infty; -2] \cup (0; +\infty)$ .

3.  $\sqrt{2}$ .

4.  $y = \frac{x+1}{x-1}$ .

5. 1.

6.  $A = \frac{1}{6}, M[X] = -2, D[X] = 3$ .

7.  $8/175$ . ( $A = C = 0, B = 3/5$ ).

8.  $u(x, t) = \frac{\sqrt{x-at} + \sqrt{x+at}}{2} + \frac{\sin x \sin at}{a} + \frac{x^2 t^3}{6} + \frac{a^2 t^5}{60}$ .

© ВМК МГУ-ППИ, 2024.

**ПРИМЕРЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЗАДАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ**

1. Найдите область сходимости функционального ряда

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3n-1} \left( \frac{1-x}{1+2x} \right)^n.$$

2. Дана Си-функция `equation()`. Если она содержит ошибку, обоснуйте это в качестве ответа. Если возможно привести код функций `f()` и `g()`, при которых функция `equation()` всегда возвращает значение `TRUE`, напишите код этих функций. Иначе обоснуйте, что хотя бы для одной из функций `f()` и `g()` это сделать нельзя.

```
#include <stdio.h>
int f(void);
int g(const int *, int);
int equation(void)
{
    int a[1024] = {0};
    int i;
    if (scanf("%d", &i) == 1 && 10 <= i && i < 100)
    {
        a[i] = 2023;
        return a[g(&a[10], 90)] == 2023;
    }
    return f() == 1 - f();
}
```

3. Базисом линейного пространства  $L_1$  являются векторы  $\bar{g}_1(2, 3, 2)$  и  $\bar{g}_2(1, 1, 3)$ , а базисом линейного пространства  $L_2$  – векторы  $\bar{f}_1(1, 1, 1)$  и  $\bar{f}_2(2, 1, 4)$ . Найдите расстояние от точки  $M(3, 4, -1)$  до пересечения пространств  $L_1$  и  $L_2$ .

4. Найдите все решения дифференциального уравнения

$$y - y' = y^2 + xy',$$

удовлетворяющие начальному условию  $y(2) = 3$ .

5. Пусть в простом неориентированном графе 65 вершин и 2021 ребро. Сколько в нем может быть компонент связности? Обоснуйте ваш ответ!

6. Плотность вероятности случайной величины  $X$  имеет вид

$$f(x) = \begin{cases} A, & \text{если } |x + 2| \leq 3, \\ 0, & \text{если } |x + 2| > 3. \end{cases}$$

Найдите значение константы  $A$ , математическое ожидание  $M[X]$  и дисперсию  $D[X]$  случайной величины  $X$ .

7. Числа  $A, B, C$  таковы, что величина

$$\int_{-1}^1 (x^3 - (Ax^2 + Bx + C))^2 dx$$

принимает **минимальное** возможное значение. Найдите это значение.

8. Найдите решение задачи (функцию  $u(x, t)$ )

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = a^2 u_{xx}(x, t) + x^2 t, & -\infty < x < +\infty, 0 \leq t < +\infty; \\ u(x, 0) = \sqrt{x}, u_t(x, 0) = \sin x, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

**Ответы:**

1.  $x \in (-\infty; -2] \cup (0; +\infty)$ .

3.  $\sqrt{2}$ .

4.  $y = \frac{x+1}{x-1}$ .

5. 1.

6.  $A = \frac{1}{6}$ ,  $M[X] = -2$ ,  $D[X] = 3$ .

7.  $8/175$ . ( $A = C = 0$ ,  $B = 3/5$ ).

8.  $u(x, t) = \frac{\sqrt{x-at} + \sqrt{x+at}}{2} + \frac{\sin x \sin at}{a} + \frac{x^2 t^3}{6} + \frac{a^2 t^5}{60}$ .



**MASTER'S DEGREE ENTRANCE EXAM (SAMPLE)**

1. Find the convergence area of the functional series

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3n-1} \left( \frac{1-x}{1+2x} \right)^n.$$

2. Given the C-function equation(). If it contain some mistakes, prove it, and answer «WRONG FUNCTION». If it's possible to create functions f() и g() such, that function equation() always returns TRUE, write the code of these functions. Otherwise, prove that at least one of the functions f() or g() cannot be created.

```
#include <stdio.h>
int f(void);
int g(const int *, int);
int equation(void)
{
    int a[1024] = {0};
    int i;
    if (scanf("%d", &i) == 1 && 10 <= i && i < 100)
    {
        a[i] = 2023;
        return a[g(&a[10], 90)] == 2023;
    }
    return f() == 1 - f();
}
```

3. The space  $L_1$  is a linear span of vectors  $\bar{g}_1(2, 3, 2)$  and  $\bar{g}_2(1, 1, 3)$ , and the space  $L_2$  is a linear span of vectors  $\bar{f}_1(1, 1, 1)$  и  $\bar{f}_2(2, 1, 4)$ . Find the distance between point  $M(3, 4, -1)$  and intersection of spaces  $L_1$  and  $L_2$ .

4. Find all solutions of differential equation

$$y - y' = y^2 + xy',$$

that satisfy condition  $y(2) = 3$ .

5. Simple unoriented graph  $G$  has 65 vertices and 2021 edge. Could the graph  $G$  be disconnected? Prove your answer!

6. The probability density of random variable  $X$  given by the formula

$$f(x) = \begin{cases} A, & \text{if } |x + 2| \leq 3, \\ 0, & \text{if } |x + 2| > 3. \end{cases}$$

Find the value of  $A$ , expectation  $M[X]$  and standard deviation  $D[X]$  of random variable  $X$ .

7. Find the minimum value of function

$$f(A, B, C) = \int_{-1}^1 (x^3 - (Ax^2 + Bx + C))^2 dx.$$

8. Solve the PDE (find  $u(x, t)$ )

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = a^2 u_{xx}(x, t) + x^2 t, & -\infty < x < +\infty, 0 \leq t < +\infty; \\ u(x, 0) = \sqrt{x}, u_t(x, 0) = \sin x, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

**Answers:**

1.  $x \in (-\infty; -2] \cup (0; +\infty)$       3.  $\sqrt{2}$ .      4.  $y = \frac{x+1}{x-1}$ .      5. No.

6.  $A = \frac{1}{6}$ ,  $M[X] = -2$ ,  $D[X] = 3$ .      7.  $8/175$ . ( $A = C = 0$ ,  $B = 3/5$ ).

8.  $u(x, t) = \frac{\sqrt{x-at} + \sqrt{x+at}}{2} + \frac{\sin x \sin at}{a} + \frac{x^2 t^3}{6} + \frac{a^2 t^5}{60}$ .